

## PRONTOFLEX 10 %

### Doporučení pro zdravotnické pracovníky

- **Je třeba zvážit přínos léčby pro každého pacienta a důsledně dodržovat indikační a kontraindikační podmínky uvedené v SPC.**
- **Je nutno informovat pacienty, kteří užívají Prontoflex 10 %, jak předcházet riziku fotosensitivních reakcí.**

### **Při léčbě topickým ketoprofenem je nutné dodržet následující pokyny, aby se předešlo riziku fotosensitivních reakcí:**

1. Informujte pacienta, že je třeba si důkladně umýt ruce po každé aplikaci přípravku.
2. Informujte pacienta, že v průběhu léčby a 2 týdny po ukončení léčena místa musí být chráněna od slunečního záření a ultrafialového záření solária.
3. Informujte pacienta, že v průběhu léčby a 2 týdny po ukončení je třeba chránit léčena místa volným oděvem, aby se zabránilo riziku fotosenzibilace (i v případě oblačného počasí).
4. Informujte pacienta, že ošetřené místo nesmí být překryto těsným (neprodyšným) obvazem.
5. Informujte pacienta, aby okamžitě přestal užívat tento přípravek, pokud se objeví jakákoli kožní reakce po aplikaci přípravku. V případě závažnější reakce je nutné vyhledat lékaře.

### **Výzva k zasílání hlášení**

Prosíme o nahlášení podezření na nežádoucí účinky léčby lokálním ketoprofenem Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. (Formulář pro hlášení a odkaz na elektronické hlášení jsou k dispozici na [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)).

nebo

držiteli rozhodnutí o registraci - CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH,  
Rudolfplatz 2/8, 1010 Vienna, Austria

**Pro úplné informace o přípravku, prosím přečtěte si aktualizovaný SPC.  
Přípravek je vázán na lékařský předpis.**