



Pomáhá při léčbě bolestivých příznaků mukozitidy v dutině ústní, které jsou způsobeny chemoterapií, radioterapií..

Umožňuje pacientům zlepšit kvalitu života

- poskytuje rychlou **úlevu od bolesti** (1)
- poskytuje významné **snížení bolesti** (2)
- snižuje **zhoršení orální mukozitidy** (3)
- zlepšuje schopnost pacienta **jíst, pít, polykat, mluvit a spát** (3,4)
- snižuje potřebu použití **parenterálního podávání, silných a opiátových analgetik**, ve srovnání s benzydaminem (doporučený terapeutický postup v MASCC / ISOO4) (4)
- snižuje **celkové množství bakterií** v ústech během prvních 6 hodin po aplikaci (5)



s GELCLAIR



bez GELCLAIR

Gelclair® je viskózní, koncentrovaný, perorální gel určený k léčbě bolestivých příznaků mukozitidy v dutině ústní

Obsahuje látky (polyvinylpyrrolidon a hyaluronát sodný), které vytvářejí na sliznici dutiny ústní **vazký adhezující film** → **překryje obnažená nervová zakončení** → dochází k úlevě od bolesti a k hydrataci sliznic.

Gelclair® je klasifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIa.

Balení přípravku Gelclair:

15 ml sáček přípravku (v 1 balení = 21 sáčků)



Láhev obsahující 180 ml přípravku

Doporučené dávkování Gelclair®: 3krát denně nebo podle potřeby.

Po použití nejméně 30 minut nejíst a nepít.

Gelclair® částečně hrazen zdravotní pojišťovnou – max. 3 balení /rok

Kód VZP	Zdravotnický prostředek	Max. cena lékárny (Kč) včetně DPH	Úhrada VZP (Kč)	Spoluúčast pacienta (Kč)
0142463	Gelclair® 21 sáčků po 15 ml	1756,52	1317,39	439,13
0142464	Gelclair® lahvička 180 ml	888,70	666,53	222,17

Preskripční omezení: hematolog, onkolog

References:

1. MacKenzie et al, Support Care Cancer 2006; 14(6): 641(abstract 16-116). 2. Lindsay et al, Australian nursing Journal April 2009(16); 9: 30-33. 3. D'Andrea et al, Annals Oncol 2003; 14(supp4): 97(abstract N2). 4. Flook C et al. Support Care Cancer 2005. 5. Helsinn, Data on File.