



## Koncentrovaný gel k vyplachování úst

### Popis výrobku

Gelclair® je viskózní gel speciálně vytvořený, aby pomáhal od bolestivých symptomů mukozitidy v orofaryngeální dutině. Vytváří ochranný film, který přilnutím k mukóze orofaryngeální dutiny dokáže zabránit dalšímu podráždění, čímž přispívá k rychlé úlevě od bolesti.

Má formu koncentrovaného gelu v sáčcích, který se rozpouští ve vodě.

### Indikace

Gelclair® pomáhá ulevovat od bolestivých symptomů mukozitidy v orofaryngeální dutině. Gelclair® užívaný jako ústní voda vytváří ochranný film, který pomáhá ulevovat od bolesti, zklidňuje poškození ústní sliznice včetně poškození způsobených léky, nemocí, radioterapií, chemoterapií, chirurgickými zákroky v dutině ústní nebo traumatickými vředy, které jsou následkem věku, nošení rovnátek nebo protéz.

### Složky

AQUA, PVP, MALTODEXTRIN, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, AROMA, DISODIUM EDTA, SODIUM HYALURONATE, SODIUM SACCHARIN, GLYCYRRHETINIC ACID, PRESERVATIVES (POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, BENZALKONIUM CHLORIDE)

### Návod k použití - láhev 180 ml

Gelclair® by se měl používat třikrát denně nebo dle potřeby. Po použití alespoň 30 - 60 minut nejzte ani nepijte.

Nalijte 15 ml přípravku Gelclair® (1 plná kávová lžička) do sklenice a přidejte přibližně 40 ml vody (3 kávové lžičky). Směs dobře promíchejte a ihned použijte. Ústa proplachujte alespoň po dobu jedné minuty nebo tak dlouho, dokud důkladně nepokryjete oblast jazyka, patra, krku, vnitřní části tváří a tkáň v dutině ústní. Vykloktejte a vyplivněte.

Nepoužitou ústní vodu zlikvidujte.

Nepolykejte.

U pacientů, kteří nejsou schopni vyplachovat a kloktat (např. malé děti), se doporučuje přípravek aplikovat přímo do úst za použití houbičky nebo tampónku.

### Návod k použití - sáček 15 ml

Gelclair® by se měl používat třikrát denně nebo dle potřeby. Po použití alespoň 30 - 60 minut nejzte ani nepijte.

Nalijte celý obsah jedné dávky přípravku Gelclair® do sklenice a přidejte přibližně 40 ml vody (3 kávové lžičky). Směs dobře promíchejte a ihned použijte. Ústa proplachujte alespoň po dobu jedné minuty nebo tak dlouho, dokud důkladně nepokryjete oblast jazyka, patra, krku, vnitřní části tváří a tkáň v dutině ústní. Vykloktejte a vyplivněte.

Nepoužitou ústní vodu zlikvidujte.

Nepolykejte.

U pacientů, kteří nejsou schopni vyplachovat a kloktat (např. malé děti), se doporučuje přípravek aplikovat přímo do úst za použití houbičky nebo tampónku.

## Kontraindikace

Použití přípravku Gelclair® je kontraindikováno u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoliv ze složek.

## Upozornění a varování

Interakce s léčivými nebo jinými přípravky nejsou známy. Přípravek však může redukovat absorpci sublingválních léků - v případě užívání léků s touto formou podání se poraďte s lékařem.

Po použití alespoň 30 - 60 minut nejezte ani nepijte.

Výrobek nepožívejte, pokud jsou láhev nebo sáček poškozené nebo uplynula doba použitelnosti.

Gel můžou při skladování ztmavnout a zhoustnout, to však nemá vliv na jeho účinnost nebo bezpečnosti.

Skládejte při pokojové teplotě, mimo dosah přímého slunečního světla.

Pokud se do týdne nedostaví zlepšení, poraďte se s lékařem. Léčba by měla být po 4 týdnech ukončena.

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

Přípravek neovlivňuje schopnost řízení a používání přístrojů.

Nepolykejte.

DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

## Nežádoucí účinky

K dnešnímu datu nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Přípravek by však neměli používat lidé s prokázanou přecitlivělostí na kteroukoliv ze složek.

## Neúmyslné spolknutí / předávkování

V době vzniku informačního letáku nebyly známy žádné případy předávkování. Přestože neúmyslné spolknutí přípravku Gelclair® nevede k nežádoucím účinkům, nedoporučuje se přípravek polykat.

## Balení

Láhev obsahující 180 ml přípravku Gelclair®.

Krabička obsahující 21 sáčků 15 ml Gelclair®.

 **Výrobce:** Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9, 6912 Pazzallo – Lugano - Švýcarsko  0123

**Distributor v České republice:** LERAM Pharmaceuticals s.r.o. - náměstí Svobody, 22 602 00 Brno  
Česká republika

Last revision: 08/2017

GS 13 03 012017

 015

**LERAM**  
- PHARMACEUTICALS

 **HEL SIN N**  
Integrative Care